

KLINISCHE INDICATIES

Apparaatsbeschrijving

The BAG Mask is een niet-steriel gezichtsmasker voor enigmalig gebruik voor gebruik met Laerdal The BAG resuscitator. Het kan meerdere keren worden gebruikt en moet worden verwijderd wanneer het vrij wordt gehouden van gebruik.

Gebruiksinstructie

The BAG Mask is bedoeld voor gebruik bij patiënten die beademing nodig hebben.

Begeleid gebrukt

The BAG Mask is bedoeld om te worden gebruikt voor beademing van de patiënt.

Het is verplicht om de volgende te voldoen:

- #1, voor gebruik bij volwassen patiënten;
- #3, voor gebruik bij pediatrische patiënten en volwassen patiënten met een kleine gezicht;
- #2, voor gebruik bij kleine pediatrische patiënten;
- #1, voor gebruik bij pasgeboren en kleine kinderen.

Begeleid gebrukt

Professionele gezondheidszorgverleners die zijn opgeleid in reanimatie, het geven van beademingondersteuning en in het gebruik van handmatige beademingsapparaten.

Klinisch voordeel

Pasopname op de klinische uitkomst door ademhalingondersteuning die de kans op nadelige uitkomsten verminderd, zoals morbiditeit en mortaliteit veroorzaakt door hypoxie.

Klinisch resultaat

De gewenste uitkomst van beademing is oxygenatie van de patiënt, vaak geëvalueerd met SpO₂, ETCO₂, bloedgasanalyse of andere analysesmethoden.

Belangrijke INFORMATIE

Geen informatie over de klinische uitkomst door ademhalingondersteuning die de kans op nadelige uitkomsten verminderd, zoals morbiditeit en mortaliteit veroorzaakt door hypoxie.

Gebruik in bewerkingen

Gezichtsbeschadiging door druk.

Contra-indicaties

Geen bekend.

Lees deze gebruiksaanwijzing en zorg dat u vóór gebruik van The BAG Mask bereid bent met de werking ervan.

Gebruik het masker alleen zoals is beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

⚠️ Waarschuwingen

Een waarschuwing geeft omstandigheden, gevaren of oorzaken aan die kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood.

* Oplsg van The BAG Mask in een gespannen

of vervormde toestand kan leiden tot permanente verformingen en het risico van onvoldoende beademing

2. Forhåndsfyll sprøyten med en viss manglede luft.

3. Fest sprøyten til mansjetters oppblåsningport.

4. Trekk ut luft til ønsket fylling av mansjetten er oppnådd.

Gjør ikke trykk på den nøytrale luftventilen.

5. Fjern sprøyten og oppbevar den for eventuell senere bruk.

Funksjonsfest

⚠️ Advarsler

* Ufør funksjonstest før hver klinisk bruk.

* Hvis enheten ikke består funksjonstest, må den tas ut av drift og ikke brukes.

1. Kontroller enheten: Kontroller at den er ren og tørr; og at den ikke er skadet, deforment eller skadet.

2. Fest sprøyten til oppblåsningporten med et tilstrekkelig fyll.

3. Kontroller at masken er forsvarlig koblet til gjennoppluftsystemet kontakt for pasientport.

Bruk av The BAG Mask

1. Finn beskyttelseshylse til The BAG Mask hvis montert.

2. Anslut maskenhet til ansiktsmasken en egnet for bruk på pasienten. Turen ansiktsmaskens mansjetten om nødvendig. Alternativt kan du velge en annen sterke type ansiktsmask.

3. Koble enheten godt fast til The BAG resuscitator.

4. Sette lekkasje fra ansiktsmasken under ventilarion, etter muligst posisjon og/eller påføring av kraft for å sikre tilstrekkelig forsøgning.

SPECIFISATJONER

Standarder

The BAG Mask overholder følgende standarder:

* ISO 5356-1-2015 Anestesi- og respiratorutstyr – Konstruksjonskrav til luftventilator – Del 1: Konektør og luftventilator

* ISO 10651-4-2023 Lungventilator – Del 4: Særlige krav til operativedrevne gjennoppluftutstyr – Avdel 1: Koble til – Kobling for ansiktsmask

* ISO 10993-1-2018 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr – Del 1

* ISO 18562-1-2017 Evaluering av biokompatibilitet for respiratoriske gassaviser i medisinsk utstyr – Del 1: Evaluering og testing innenfor en risikostyringss prosess

* EN 1789-2020 – Ambulanse- og ambulansutstyr

3. En annen en ren 50 ml-spruta med Luer-Lock-spids.

(Tilhåndhålls inte av Laerdal).

4. Tøm spruta på luft.

5. Fest spruta til oppblåsningporten oppnådd.

6. Fjern sprøyten og oppbevar den for eventuell senere bruk.

Miljøforhold

⚠️ Viktigt

Rubriken Viktigt opplyser om forhållanden, farer og risikabel användning som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

* The BAG Mask är endast avsedd för användning på patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Om patienten har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

* Väl omständigt att långtgå maskstörel för patienter som har fått utvärdering från en anestesiolog och godkänt tillstånd för att använda ansiktsmasken som passande patient för masken.

</div